

الخدمات
العيادية
رعاية طبية

أشياء يجب معرفتها:

الموافقة

- من المهم أن تفهمي الإجراء وأيضاً أي مخاطر، وأن تكوني متأكدة من اختيارك.
 - مخاطر الإجهاض الدوائي موصوفة في قسم المخاطر الطبية.
 - سنطلب منك إعطاء موافقتك الخطية على الإجراء.
- ❗ إذا لم تفهمي أي شيء في هذا الكتيب، أو إذا كان لديك أي أسئلة، أو إذا كنتِ تشعرين أنكِ تتعرضين للضغوط أو الإكراه، يرجى إعلامنا بذلك.

خدمات المترجم الشفهي

يرجى إعلامنا إذا كنتِ بحاجة إلى مترجم على الهاتف لمساعدتك على فهم أي من هذه المعلومات. إذا كنتِ بحاجة لمترجم في أي وقت قبل الإجراء الخاص بكِ أو بعده، يمكنكِ الاتصال بـ **TIS National** (خدمة الترجمة الكتابية والشفهية الوطنية) على الرقم **131 450** واطلبي الاتصال بـ **Marie Stopes Australia** على الرقم **1300 003 707**.

إمكانية الوصول إلى المستند

تتوفر نسخة نصية يمكن الوصول إليها لهذا المستند عبر الإنترنت على mariestopes.org.au/accessible

يحتوي هذا الكتيب على معلومات حول الإجهاض الدوائي الخاص بكِ. اقرئي هذه المعلومات بعناية واحتفظي بها للنظر إليها لاحقاً. اطرحي علينا أسئلة إذا كان لديكِ أي منها بعد قراءتها.

تقديم شكوى أو إبداء رأي

إذا كنتِ ترغبين في إبداء أي آراء، يمكنكِ أن:

- تتحدثي إلى أي موظف في العيادة
- تكتبي مباشرة إلى العيادة
- تتصلي بالمركز الخاص بنا للدعم الوطني على الرقم **1300 003 707**
- تستخدمني استمارتنا الخاصة بإبداء الآراء على الصفحة الرئيسية لموقعنا: mariestopes.org.au



الرعاية والدعم قبل الإجراء الخاص بك وأثناءه وبعده

المترجم الشفهي:

اتصلي بالرقم 131 450

واطلبي الاتصال بـ Marie

على Stopes Australia

الرقم 1300 003 707

24/7 رعاية لاحقة:

1300 888 022

mariestopes.org.au

اتصلي بنا إذا واجهتِ أي من المشاكل التالية أو إذا كان لديك أي مخاوف بخصوص:

- خروج جلطات (كتل) أكبر من حجم كرة التنس
- نزيف شديد يستمر لمدة تزيد عن أسبوعين
- ابتلال تام لفوطه صحية نسائية ماكسي كل 30 دقيقة لمدة أكثر من ساعتين
- حمى أو قشعريرة أو ألم شديد أو آثار جانبية أخرى تستمر لأكثر من 24 ساعة بعد أخذ المرحلة 2 (الميزوبروستول)
- ألم شديد لا يتوقف في البطن
- شعور بالغثيان بعد أكثر من أسبوع من علاجك
- شعور بالتعب أو الإعياء بشكل عام
- آلام في الثديين لمدة أسبوعين بعد الإجراء الذي خضعتِ له
- عدم الحيض كالمعتاد، بعد 4-8 أسابيع من علاجك
- استمرار أعراض الحمل.

اتصلي بنا على الفور إذا ظهرت عليكِ علامات محتملة للعدوى (للالتهاب):

- حمى
- شعور بإعياء بشكل عام (أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا)
- ألم مستمر في البطن
- إفرازات مهبلية غير عادية

